

¿Por qué analizar Leucosis y Brucelosis Bovina al mismo tiempo?

- ✓ Reduce el número de sangrados a campo, ya que con un mismo suero se puede analizar ambas enfermedades.
- ✓ Reduce los costos de materiales de extracción y de mano de obra.
- ✓ Minimiza el stress de los bovinos, evitando movimientos de animales continuos.
- ✓ Evita sangrados continuos que pueden diseminar rápidamente la enfermedad.
- ✓ En aquellos establecimientos donde se realiza la refrendación anual le permite sistematizar dicho trabajo.

¿Qué nos aporta un resultado de Leucosis?

- Una fotografía del rodeo, nos permite evaluar la sanidad actual de nuestros animales.
- Es un valor agregado al momento de la venta, que le permite competir en los mercados de altas exigencias.
- Valorar un ganado en función de positivos o negativos a Leucosis al momento de su compra.
- Planificar la exportación de ganado en pie, ya que es una barrera sanitaria que limita el ingreso a varios mercados internacionales.
- Seleccionar por positivo o negativo a Leucosis nos permite disminuir las pérdidas por muertes, mermas en la producción, refugos, decomisos así como por problemas reproductivos.
- Reducir los gastos de tratamientos contra patologías inespecíficas.
- Utilizar el resultado como una herramienta económica al momento de la compra (reposición) y venta (ventas particulares, exportación, remates, ferias) de animales.

¿Qué medidas podemos tomar frente a la presencia de Leucosis?

- Desinfectar y lavar adecuadamente todo tipo de instrumental que puede estar contaminado con sangre. Ello incluye: señalar o caravanear; instrumentos de castración o descorne; implementos para la inseminación artificial, etc.
- Extremar las medidas de higiene para evitar el contagio, mediante el uso de agujas descartables cuando se administran inyectables y fundamentalmente en oportunidad de extracciones de sangre.
- Emplear guantes descartables cuando se realiza la palpación rectal, especialmente si existen hemorragias durante el mencionado procedimiento.
- Mochar las terneras antes de los 6 meses de edad usando métodos que eviten el sangrado (se recomienda promover el uso de la mochadora térmica)



- Instrumentar un programa básico de control de insectos hematófagos (mosca de los cuernos, tábanos, etc.), con énfasis en las épocas de mayor incidencia.
- Realizar los servicios mediante Inseminación Artificial con semen certificado negativo. En caso que sea justificado utilizar toros, los mismos deberán ser negativos y controlarse regularmente.
- Evitar el consumo de calostro procedente de vacas positivas por parte de las terneras. De ser posible se procurará confeccionar un banco de calostro negativo, sea tanto congelado o bajo forma de silo.
- Implementar una estrategia sostenida de refugio sanitario, definido como prioridad para la eliminación a las vacas seropositivas a Leucosis Bovina.
- Evitar el ingreso de animales positivos a los rodeos.